

USO DEL CBD (EVEXIA) IN CASO DI DERMATOPATIA DI ORIGINE PSICOGENA


Dott.ssa Buglioni Sabrina e Dott.ssa Carocci Francesca

Ambulatorio veterinario Le Accademie

Viale delle Accademie 43 00147 Roma

SEGNALAMENTO:

Cane meticcio femmina, 4 anni, peso 11,5 kg, di nome Laika; il cane vive a Roma.



Laika è stata presa da una famiglia quando era cucciola. La cagnolina ha un carattere estremamente diffidente sia con le persone che nei confronti di altri cani; può mordere se si sente in difficoltà. Soffre di atteggiamenti psicogeni come urinazione inappropriata ed abbaia in modo continuativo; si lecca ripetutamente le zampe durante la notte.

MOTIVO DELLA VISITA:

Viene portata in visita perché soffre da sempre di una dermatite localizzata a livello dell'addome, piatto interno cosce ed ascelle; si manifesta con abbondante rossore, macchie, bollicine e perdita di pelo. Durante questi sfoghi si gratta in maniera compulsiva ed è più agitata.

ANAMNESI:

La proprietaria riferisce che il problema è iniziato dopo qualche giorno dalla morte della cagnolina con la quale conviveva. Altri colleghi hanno somministrato Apoquel per 30 giorni e cibo ipoallergenico. La cagnolina è stata anche visitata da veterinari comportamentisti. Laika è regolarmente vaccinata, vive in casa, viene trattata con Nexgard e lavata mensilmente.

ESAME FISICO

Temperatura 38,5 °C

Peso 11,5 kg (cagnolina in sovrappeso)

Mucose rosate

Cute molto arrossata con lesioni da grattamento nella regione addominale.





ITER DIAGNOSTICO

Dieta ad esclusione

raschiato cutaneo

emocromo e biochimico completo.

Diagnosi differenziale: dermatite psicogena
 dermatite da intolleranza alimentare
 dermatite da ectoparassiti

PIANO TERAPEUTICO

- Evexia al doppio del dosaggio cioè 2 cpr al dì per i primi 20 gg, poi 1 cpr al dì per altri 20 gg
- dieta con pasta di mais, arista di maiale e verdure bollite; 3 pasti al dì
- acidi grassi, omega 3 ed omega 6
- no lavaggi per almeno 4 mesi

FOTO DOPO TRATTAMENTO





COMMENTI

Non sono stati usati antibiotici.

Durante la visita di controllo effettuata dopo 30 gg dall'inizio del trattamento i proprietari riferiscono che il cane non si lecca più in modo compulsivo le zampe.

La cagnolina ha perso peso: peso attuale 10,6 kg.

Sono scomparse le bollicine ed anche il rossore diffuso.

Nel complesso anche il carattere sembra più tranquillo.